

## ROM

2gm ampicillin المريضة الحرارة و تعطي

وتطلع علي كرسي او ترولي / العيانة دي ماتمشيش

2 patients not to walk: ROM, placenta previa


## Management

### Before 24: 2<sup>nd</sup> trimester abortion

R Misotac قرصين من فوق و قرصين من تحت

Cervical ripening

- هدخل قسطرة و قفلها ب 50 سم ملح
- و ادخل من الناحية الثانية 10 سم ملح منوب فيهم قرص Misotac



- اول ما ال Cervix يفتح ادي 500/10
  - اول مالعيل ينزل ادي 500/20
  - اول م ال placenta تنزل ادي 500/22
- هنا في القسم بيبدنوا conserve من 24 اسبوع

### انا مع العيل مادامت الام كويسه 24-37

Fetus Prematurity

R Dexamethasone/6h

R Konakion/12 H

For infection: most common pathogen is group B-hemolytic streptococci

R Ampicillin 1gm /6h for 1 week

R Erythromycin 500mg /6h for 2 weeks

## Regular Check up

- » US → AFI
- » For infection:
  - Temperature: Fever  $>37^{\circ}\text{C}$
  - FHR: Fetal/ maternal tachycardia
  - ESR, CRP

## If more than 37 weeks

Cervix اشوف

- » Favorable → SVD
- » Not favorable
  - Primigravida → C. Section
  - Misotac ربيع قرص → لو لسه مبيفتحش → C. Section

If oligohydramnios → C. Section